

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiang Mai University

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสัมภาษณ์

แบบสัมภาษณ์เพื่อการศึกษาเรื่อง ความพร้อมและการยอมรับของมารดาในระยะแรกหลังคลอด ในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา ที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่

คำชี้แจง

1. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
 - ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว จำนวน 15 ข้อ
 - ส่วนที่ 2 ประสบการณ์ที่ได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาจากบุคลากรสถานบริการทางสุขภาพ จำนวน 12 ข้อ
 - ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา
 - 3.1 ความพร้อมด้านร่างกายในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา แบ่งเป็น
 - ก. ความไม่สุขสบายของร่างกายในระยะแรกคลอด จำนวน 6 ข้อ
 หมายเหตุจากข้อที่1 ผิดปกติมาก หมายถึง หัวนมบอด หรือแตก
 ผิดปกติปานกลาง หมายถึง หัวนมมุ่ม
 ผิดปกติน้อย หมายถึง หัวนมสั้นมาก
 ผิดปกติน้อยมาก หมายถึง หัวนมสั้นเล็กน้อย
 - ข. ความพร้อมด้านร่างกายทั่วไป (การปฏิบัติ) จำนวน 14 ข้อ
 - 3.2 ความพร้อมด้านจิตใจในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา จำนวน 12 ข้อ
 - 3.3 ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา จำนวน 8 ข้อ
 - ส่วนที่ 4 การยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาโดยรวม 5 ชั้น จำนวน 26 ข้อ
 - ชั้นที่ 1 และ 2 การให้ความสนใจและการตอบสนองในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา
 - ชั้นที่ 3 การเกิดค่านิยมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา
 - ชั้นที่ 4 การจัดระบบค่านิยมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา
 - ชั้นที่ 5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมในการให้เลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาโดยปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ

7. รายได้ของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนเท่าไร (คิครวมทั้งสามีและภรรยา)
- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1. () $\leq 3,000$ | 4. () 9,001-12,000 |
| 2. () 3,001-6,000 | 5. () 12,001-15,000 |
| 3. () 6,001-9,000 | 6. () อื่นๆระบุ..... |
8. สถานภาพสมรส
- | | |
|-------------|--------------|
| 1. () คู่ | 3. () หม้าย |
| 2. () หย่า | 4. () แยก |
9. ปัจจุบันจำนวนสมาชิกในครอบครัวมี _____ คน
10. ท่านพักอาศัยอยู่กับใครบ้าง
- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1. () อยู่กับสามีตามลำพัง | 5. () อยู่กับบุตร |
| 2. () อยู่กับญาติ | 6. () อยู่กับสามีและบุตร |
| 3. () อยู่กับสามี และญาติ | 7. () อยู่กับสามี ญาติและบุตร |
| 4. () อยู่คนเดียวตามลำพัง | 8. () อื่นๆ ระบุ |
11. จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่ (รวมบุตรที่เพิ่งคลอดด้วยและถ้าเป็นบุตรคนแรกให้ใส่เป็นคนปัจจุบันด้วย) _____ คน เพศชาย _____ คน เพศหญิง _____ คน
12. บุตรคนสุดท้าย (คนปัจจุบัน) เป็นคนที่ _____ ของบุตรที่มีชีวิตอยู่
13. เพศของบุตรคนสุดท้าย (คนปัจจุบัน) () ชาย () หญิง
14. น้ำหนักแรกคลอดของบุตรคนสุดท้าย (คนปัจจุบัน) _____ กรัม
15. ท่านเคยเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาหรือไม่ () เคย () ไม่เคย
- ชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงบุตรคนที่ 1 _____ หย่านมเมื่อไร _____.
- ชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงบุตรคนที่ 2 _____ หย่านมเมื่อไร _____.
- ชนิดของนมที่ใช้เลี้ยงบุตรคนที่ 3 _____ หย่านมเมื่อไร _____.

ส่วนที่ 2 ประสพการณ์ที่ได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจากสถานบริการสุขภาพ (ตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอด)

1. การฝากครรภ์

1. () ไม่ฝากครรภ์

2. () ฝากครรภ์ ระบุสถานที่ฝากครรภ์.....

2. ท่านเคยได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจากบุคลากรของสถานบริการสุขภาพ

1. () ไม่เคย ได้รับความรู้จากแหล่งอื่น ระบุ

2. () เคย จากใครบ้าง () แพทย์

() พยาบาล

() เจ้าหน้าที่อื่นๆ ระบุ.....

เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง (ให้ถามรายละเอียดในข้อย่อยข้างล่าง)

ข้อความ	ทุกครั้งที่มา รับบริการ	ส่วน ใหญ่	บาง ครั้ง	น้อย มาก	ไม่ เคย
2.1 ประโยชน์ของการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา					
2.2 การเตรียมหัวนมและเต้านมสำหรับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา (โดยการคลึงและดึงหัวนมและนวดเต้านม) ในกรณีที่หัวนมปกติและผิดปกติ					
2.3 วิธีการทำความสะอาดหัวนมและเต้านม					
2.4 การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาทันทีที่ทารกได้อยู่กับมารดา ในระยะแรกหลังคลอด					
2.5 การจัดบริการอำนวยความสะดวกในการนำบุตรมาอยู่กับมารดาโดยเร็วที่สุด					
2.6 ขั้นตอนในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา วิธีปฏิบัติเมื่อมีอาการคัดตึงเต้านมโดยการให้ทารกดูดนมมารดาสม่ำเสมอและประคบเต้านมด้วยความร้อนสลับเย็น					

ข้อความ	ทุกครั้งที่มา รับบริการ	ส่วน ใหญ่	บาง ครั้ง	น้อย มาก	ไม่ เคย
<p>2.8 วิธีปฏิบัติเมื่อมีอาการห้วนนมแตก โดยการล้างห้วนนมด้วยน้ำอุ่นสะอาดทาครีมหรือน้ำมันมะกอกหรือทาด้วยน้ำมันมารดาเองแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง ถ้ามีห้วนนมแตกมากควรงดให้บุตรดูดนมข้างนั้นไว้ก่อน</p>					
<p>2.9 วิธีการแก้ปัญหาเมื่อมีน้ำนมไม่พอโดยการนวดเต้านม ให้ทารกดูดนมมารดาสม่ำเสมอ ดื่มน้ำมากๆ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และพักผ่อนให้เพียงพอ</p>					
<p>2.10 การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง 5 หมู่ คือ เนื้อ นม ไข่ ผักและผลไม้ ในปริมาณที่เพียงพอ</p>					
<p>2.11 งดอาหารที่ให้โทษแก่ร่างกาย ได้แก่ อาหารหมักดอง ชา กาแฟ ยาอดงเห็ด้าและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์</p>					
<p>2.12 ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ 10-12 แก้ว</p>					

ส่วนที่ 3 ความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

3.1 ความพร้อมด้านร่างกายในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

ข้อความ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่มี	หมายเหตุ
<p>ก. ท่านมีความผิดปกติและความไม่สุขสบายของร่างกายในระยะแรกหลังคลอดเหล่านี้มากน้อยเพียงใด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หัวนมของท่านมีลักษณะผิดปกติ 2. มีอาการคัดตึงเต้านม 3. ปริมาณน้ำนม 4. มีอาการปวดแผลฝีเย็บ 5. มีอาการปวดมดลูก 6. มีอาการอ่อนเพลีย ระบุสาเหตุ..... 						

ข้อความ	เป็นประจำ สม่ำเสมอ	ส่วนใหญ่	บางครั้ง	น้อย มาก	ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>ข.ท่านมีความพร้อมด้านร่างกาย โดยการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดอย่างไร</p> <p>1.ในระยะตั้งครรภ์ได้ดูแลสุขภาพทั่วไปไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยและมีอาการเจ็บป่วยรีบปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุขทุกครั้ง</p> <p>2. ในระยะตั้งครรภ์ท่านงดการทำงานหนักที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย</p> <p>3. ในระยะตั้งครรภ์ท่านได้ออกกำลังกาย</p> <p>4. ในระยะตั้งครรภ์ท่านได้ดูแลรักษาความสะอาดของหัวนมและเต้านมทุกครั้งหลังอาบน้ำ</p> <p>5. ในระยะตั้งครรภ์ท่านได้มีการเตรียมเต้านมโดยการนวดเต้านม และเตรียมหัวนมโดยการคลึงและการดึง (ทั้งในกรณีที่หัวนมปกติและผิดปกติ)</p> <p>6.ในระยะตั้งครรภ์ท่านรับประทานยา เช่น วิตามิน และยาบำรุงอื่นๆ ตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรง</p> <p>7. ในระยะตั้งครรภ์และระยะแรกหลังคลอด ท่านได้รับประทานอาหารประเภท เนื้อสัตว์ ปลา ไข่ นม ผักสด และผลไม้ ได้ครบในแต่ละวัน</p> <p>8. ในระยะตั้งครรภ์และระยะแรกหลังคลอด ท่านงดอาหารและเครื่องดื่มประเภท ของคอง ยา คองเห็ด้า ชา กาแฟ และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์</p> <p>9. ในระยะตั้งครรภ์และระยะแรกหลังคลอด ท่านสวมเสื้อยกทรงที่มีขนาดพอเหมาะกับเต้านม ในเวลากลางวัน</p> <p>10.ระยะแรกหลังคลอดท่านมีการพักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ (นอนหลับอย่างเพียงพออย่าง</p>						

ข้อความ	เป็น ประจำ สม่ำเสมอ	ส่วน ใหญ่	บาง ครั้ง	น้อย มาก	ไม่ ปฏิบัติ	หมายเหตุ
<p>น้อยคืบละ 6-8 ชั่วโมง กลางวัน 1-2 ชั่วโมง)</p> <p>11. ในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตรท่านได้ ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 10-12 แก้ว</p> <p>12. ในระยะหลังคลอดและให้นมบุตรท่านได้ดูแล รักษาความสะอาดของร่างกาย โดยการอาบน้ำ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ทำความสะอาดอวัยวะเพศ ทุกครั้งหลังขับถ่าย และเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกครั้ง ที่ ชุ่ม</p> <p>13. ในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตรท่านมี การดูแลตนเองเพื่อให้มีความพร้อมในการให้นม บุตร โดยเมื่อมีอาการไม่สบายขอคำแนะนำจาก แพทย์หรือบุคลากรทางสาธารณสุข เช่นเวลาปวด แผลก็ขอยาแก้ปวด</p> <p>14. ในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตรท่านได้ บริหารร่างกายหลังคลอดตามคำแนะนำที่ได้รับ จากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางสาธารณสุข</p>						

3.2 ความพร้อมด้านจิตใจในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

ข้อความ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<p>ท่านมีความพร้อมด้านจิตใจในรายละเอียดต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด</p> <p>1. ขณะที่ท่านตั้งครรภ์กับบุตรคนนี้ท่านรู้สึกดีใจและภูมิใจ</p> <p>2. ในระยะตั้งครรภ์ท่านมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเอง</p> <p>3. ท่านคิดว่าน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่อตัวท่านและบุตร</p> <p>4. ท่านคิดว่าการเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเองก่อให้เกิดความรำคาญหรือรบกวนความสุขสบายของท่าน*</p> <p>5. ท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดามากน้อยเพียงใด*</p> <p>6. ท่านมีความวิตกกังวลในเรื่องอื่นๆ* ระบุ.....</p> <p>7. ท่านเกิดอาการซึมเศร้าในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตร*</p> <p>8. ท่านมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตร*</p> <p>9. ในระยะแรกหลังคลอดและให้นมบุตรท่านมีความเต็มใจที่จะเลี้ยงบุตรด้วยนมตนเอง</p> <p>10. ท่านได้มีการพักผ่อนทางด้านจิตใจ เช่น ชมรายการโทรทัศน์ และอ่านหนังสือ และอื่นๆ ระบุ.....</p> <p>11. ท่านคิดว่าเพศของบุตรคนนี้เป็นไปตามความต้องการของท่าน</p> <p>12. ท่านคิดว่าการให้นมบุตรจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างมารดาและบุตร</p>						

* ข้อความด้านล่าง

1.3 ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา

ข้อความ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<p>ท่านมีความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนในรายละเอียดต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ท่านเคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา (พิจารณาระยะเวลาที่ให้นมบุตรและจำนวนบุตร) 2. ในระยะตั้งครรภ์ท่านได้รับความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา การดูแลหัวนมและเต้านมจากบุคลากรทางการแพทย์เมื่อมารับบริการ 3. สามีได้กระตุ้นเตือนและเอาใจใส่โดยการจัดหาอาหารที่มีประโยชน์ในระยะตั้งครรภ์และระยะแรกหลังคลอดแก่ท่าน 4. สามีได้คอยเตือนให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเพียงพอกับความต้องการของร่างกายในระยะตั้งครรภ์และระยะแรกหลังคลอด 5. สามีได้ให้กำลังใจท่านในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา 6. สามีมาเยี่ยมและได้ให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา 7. บุคคลอื่นๆ เช่น ญาติ เพื่อนบ้าน หรือ เพื่อนมาเยี่ยมและกระตุ้นรวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาแก่ท่าน 8. ในระยะแรกหลังคลอดท่านได้รับการกระตุ้นและแนะนำให้เลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ 						

ส่วนที่ 4 การยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาโดยรวม 5 ชั้น

ข้อความ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<p>ท่านยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาในรายละเอียดต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด</p> <p><u>ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 การให้ความสนใจและการตอบสนองในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา</u></p> <p>1. ท่านมีความพอใจและยินดีที่ได้รับคำแนะนำเรื่องการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจากเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางสาธารณสุข</p> <p>2. ท่านได้แสวงหาความรู้ในเรื่องการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาจากสื่อต่างๆ ได้แก่ หนังสือ วิทยุ โทรทัศน์ และคู่มือ</p> <p>3. ท่านมีความกระตือรือร้นในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา</p> <p>4. เมื่อท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาได้ขอคำปรึกษาและซักถามบุคคลที่มีความรู้หรือบุคลากรทางสาธารณสุข</p> <p><u>ชั้นที่ 3 การเกิดค่านิยมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา</u></p> <p>5. ท่านคิดว่าความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาที่ได้รับจากแหล่งต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์ช่วยให้ท่านเกิดความมั่นใจในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา</p> <p>6. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดานั้นดีกว่าการเลี้ยงด้วยนมผสม</p> <p>7. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาไม่มีผลทำให้เต้านมเสียรูปทรง</p> <p>8. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา มีความสะดวก สะอาดและปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียม</p>						

ข้อความ	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยมาก	ไม่ใช้	หมายเหตุ
<p>9. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาช่วยให้มดลูกเข้าอู่ได้เร็วขึ้น</p> <p>10. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาทำให้รูปร่างของมารดากลับคืนสู่สภาพเดิมได้เร็ว</p> <p>11. ท่านเชื่อว่าการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย</p> <p><u>ขั้นที่ 4 การจัดระบบค่านิยมในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา</u></p> <p>12. ท่านคิดว่าจะแนะนำบุคคลที่ใกล้ชิดให้เลี้ยงทารกด้วยนมมารดา</p> <p>13. ขณะที่ท่านให้นมบุตรได้กอดและสัมผัสบุตรทำให้ท่านเกิดความรู้สึกรักใคร่และผูกพัน</p> <p>14. สามียให้ความช่วยเหลือขณะที่ท่านให้นมบุตรทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว</p> <p>15. ท่านรู้สึกภูมิใจที่จะได้เลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา</p> <p>16. ท่านรู้สึกว่าท่านจะได้ทำหน้าที่ความเป็นมารดาสมบูรณ์ถ้าเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดา</p> <p><u>ขั้นที่ 5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาโดยการปฏิบัติถูกต้องตามหลักการ</u></p> <p>17. ท่านได้เลี้ยงทารกด้วยนมมารดาตั้งแต่วันแรกหลังคลอดจนถึงวันนี้</p> <p>หมายเหตุเริ่มให้นมมารดาวันที่ระบุ</p> <p>18. ถึงแม้ท่านจะปวดแผลหรือปวดมดลูกก็มีความอดทนที่จะเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา</p> <p>19. ก่อนและหลังให้นมบุตรท่านล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาด</p> <p>20. ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีการทำความสะอาดหัวนมและเต้านมก่อนและหลังให้นมบุตร</p> <p>21. ท่านสามารถอุ้มทารกให้ศีรษะอยู่สูงกว่าลำตัวเมื่อ</p>						

ข้อความ	มาก	ปาน กลาง	น้อย	น้อย มาก	ไม่ใช่	หมายเหตุ
<p>เมื่อผู้มทากรในทำนังขณะให้นมบุตร</p> <p>22. ในแต่ละมือท่านได้ให้ทารกดูดนมมารดาโดยให้ ดูดนมมารดาทั้งสองเต้าสลับกัน</p> <p>23. หลังให้นมท่านได้ผู้มทากรพาดบ่าหรือผู้มทากรให้ อยู่ในทำนังเพื่อให้เธอ</p> <p>24. ท่านบีบน้ำนมที่เหลือทิ้งหลังให้นมบุตรเพื่อช่วยให้ เต้านมว่างและมีการสร้างน้ำนมใหม่อย่างเพียงพอใน ระยะเวลาที่ต้องการ</p> <p>25. การให้ทารกดูดนมมารดาครั้งต่อไปท่านได้เริ่ม ให้ดูดจากเต้านมข้างที่ดูดทีหลังเมื่อมือก่อนหน้านี้</p> <p>26. ท่านคิดว่าจะให้นมบุตรอย่างต่อเนื่องจนถึง 6 เดือน ระบุ..... () ให้นมมารดาอย่างเดียว () ให้นมมารดาสลับกับนมผสม</p>						

คู่มือแบบสัมภาษณ์

จากข้อความข้อที่ 17 การเลี้ยงทารกด้วยนมมารดาตั้งแต่ระยะแรกหลังคลอดตามหลักการ คือ หลังคลอดประมาณ 2 ถึง 8 ชั่วโมง ไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง มารดาควรเริ่มให้ทารกดูดนมมารดา เป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหลั่งของน้ำนมเร็วขึ้นและเป็นการหัดให้ทารก รู้จักดูดนมมารดา จากนั้นให้ทารกดูดครั้งต่อไปทุก 2-3 ชั่วโมง หรือเมื่อทารกแสดงอาการว่า ต้องการนม เช่น ร้อง หรือดูดนิ้วเป็นต้น

จากข้อความข้อที่ 16 วิธีการทำความสะอาดหัวนมและเต้านมก่อนและหลังให้นมบุตรที่ถูกต้อง ตามหลักการ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1. ใช้สำลีชุบน้ำอุ่นหรือน้ำต้มสุกเช็ดบริเวณหัวนม 1 ครั้งแล้วทิ้ง ถ้าบริเวณหัวนมมี สะเก็ดน้ำนมเหลืองหรือคราบโคลนแห้งติดที่หัวนม ห้ามแกะ ให้ใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆ หรือสำลีชุบน้ำอุ่น ประคบไว้ให้คราบนิ่มลอกตัวแล้วค่อยๆ เช็ดออก
2. นำสำลีชุบน้ำอุ่นหรือน้ำต้มสุกเช็ดเป็นวงกลมรอบๆ ตั้งแต่บริเวณลานนมไปจนถึงฐานนมแล้วทิ้งโดยไม่มีการเช็ดย้อนกลับ ถ้าเต้านมยังไม่สะอาดให้ใช้สำลีก้อนใหม่ชุบน้ำอุ่น หรือน้ำต้มสุกเช็ดซ้ำอีกครั้งในลักษณะเดิม
3. ทำให้ครบทั้งสองข้างแล้วทิ้งไว้ให้แห้ง
4. ทำความสะอาดเต้านมทั้งก่อนและหลังให้นมบุตรทุกครั้ง

จากข้อความข้อที่ 21 การอุ้มบุตรในการให้นมที่ถูกต้องตามหลักการ มีหลักการปฏิบัติดังนี้

นั่งหรือนอนในท่าสบาย อุ้มบุตรให้ศีรษะสูงกว่าลำตัวเมื่อบุตรอยู่บนตัก เมื่อนอนบนที่นอน ให้ปากอยู่ในระดับเดียวกับหัวนม ท่าในการให้นมบุตรนั้นมารดาสามารถเลือกปรับได้ตามความถนัดและความเหมาะสมกับสภาพของร่างกายในระยะหลังคลอด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสุขสบายที่สุดแก่มารดา ใช้แขนโอบรอบตัว มีรองรับอยู่ที่ก้นหรือต้นขาบุตร จับบุตรนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาอกมารดา ศีรษะบุตรวางบนข้อพับของแขน ปรับแขนให้ปากบุตรอยู่ระดับเดียวกับปลายหัวนม ใช้มืออีกข้างหนึ่งซ้อนใต้ราวนม วางนิ้วหัวแม่มือที่ด้านบนของเต้านมอีกส้นนิ้วอยู่ข้างใต้ใช้นิ้วชี้กดผิวหนังเข้าหาตัวพร้อมกับพลิกนิ้วหัวแม่มือไปข้างหน้า(อยู่เหนือลานนม) ถ้าสังเกตจะเห็นปลายหัวนมชี้ลงตรงกับปากของบุตรพอดี สอดหัวนมเข้าปากให้พอดีกับจังหวะอ้าปากของบุตร ใ้บุตรอมหัวนมเข้าไปลึกๆ จนเหงือกบุตรกดบริเวณลานนม หรืออีกวิธีหนึ่ง วางหมอนหรือเบาะบนตัก จับบุตรนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาเต้านมมารดาเช่นเดียวกัน แต่ใช้มือซ้อนใต้คอ ถูกแทนการโอบกอด การสอดหัวนมเข้าปากบุตรปฏิบัติเช่นเดิม มารดาอาจใช้นิ้วมือกดเต้านมเบาๆ เหนืองอกบุตรเพื่อช่วยให้หายใจได้สะดวกในกรณีที่มารดามีเต้านมใหญ่ การอุ้มบุตรควรแนะนำ

มารดาให้ระมัดระวังอย่าให้ห้วนมเลื้อนหลุดจากปาก โดยกดกระชับบุตรเข้าแนบตัวในลักษณะตัว
บุตรงอคล้ายตัวอักษรซี (C)

จากข้อความข้อที่ 23 วิธีการอุ้มบุตรเพื่อให้เรอหลังให้นมที่ถูกต้องตามหลักการ มีหลักใน
การปฏิบัติดังนี้

1. ทำนั่งบนตัก มารดาจัดให้ทารกนั่งอยู่บนตักโดยใช้มือข้างหนึ่งประคองบริเวณใต้คาง
ของบุตร มืออีกข้างหนึ่งอุ้มบริเวณแผ่นหลังของบุตรจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งบุตรเรอ
2. ทำอุ้มพาดบ่า มารดาอุ้มบุตรขึ้นพาดบ่าโดยใช้แขนโอบรอบตัวมือรองรับอยู่ที่ก้น
ของบุตร ใช้มืออุ้มบริเวณแผ่นหลังจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน จนกระทั่งบุตรเรอ ระวังอย่าให้จมูก
บุตรกดทับกับหัวไหล่ของมารดา

ภาคผนวก ข

สถิติที่ใช้ในการศึกษา

1. การหาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค (coefficient alpha by Cronbach) (เพชรน้อย สិងห์ช่างชัย และคณะ, 2539, หน้า 212)

จากสูตร

$$\alpha \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_x^2} \right]$$

σ = ความเชื่อมั่นของแบบวัด

n = จำนวนข้อคำถาม

σ_i^2 = ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ

σ_x^2 = ความแปรปรวนของคะแนนผู้ตอบทั้งหมด

2. หาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาโดยรวมและรายด้านกับคะแนนการยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา วิเคราะห์โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งมีสูตรดังนี้ (จรัญ จันทลักษณ์ และอนันต์ชัย เขื่อนธรรม , 2529, หน้า 232)

$$r = \frac{\sum XY - (\sum X)(\sum Y) / n}{\sqrt{[\sum X^2 - (\sum X)^2 / n][\sum Y^2 - (\sum Y)^2 / n]}}$$

เมื่อ r = สัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างคะแนน ความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดากับคะแนนการยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

$\sum X$ = ผลรวมของคะแนนความพร้อมในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

$\sum Y$ = ผลรวมของคะแนนการยอมรับในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดา

3. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้ค่าไค - สแควร์ (chi - square) (เพชรน้อย สิงห์ช่างชัยและคณะ, 2539, หน้า 342)

จากสูตร

$$X^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{f=1}^c \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

X^2 = ค่าความสัมพันธ์ไค - สแควร์

O_{ij} = จำนวนความถี่ข้อมูล ที่ได้จากการสังเกตแถวที่ i สดมภ์ที่ j

E_{ij} = จำนวนความถี่ข้อมูล ที่ได้จากการคาดหวังแถวที่ i สดมภ์ที่ j

$$= \frac{(n_i)(n_j)}{N}$$

$$= \frac{(\text{ผลรวมความถี่แถวที่ } i)(\text{ผลรวมของสดมภ์ที่ } j)}{\text{ผลรวมของความถี่ทั้งหมด}}$$

C = จำนวนสดมภ์

R = จำนวนแถว

การคำนวณดัชนีความตรงตามเนื้อหา (Wattz.&Bausell,1981)

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหา (content validity index)} = \frac{\text{จำนวนข้อที่เห็นด้วยตรงกัน}}{\text{จำนวนข้อทั้งหมด}}$$

ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์ ความพร้อมและการยอมรับของมารดา ระยะแรกหลังคลอดในการเลี้ยงทารกด้วยนมมารดา ได้จากค่าเฉลี่ยความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 5 ท่าน

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 2} = 0.91$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 3} = 0.92$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 4} = 0.92$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 1 และคนที่ 5} = 0.91$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 3} = 0.95$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 4} = 0.97$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 2 และคนที่ 5} = 0.92$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และคนที่ 4} = 0.98$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 3 และคนที่ 5} = 0.93$$

$$\text{ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ 4 และคนที่ 5} = 0.94$$

$$\text{รวม} = 9.35$$

$$\text{จำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ} = 10 \text{ คู่}$$

$$\text{ดังนั้น ดัชนีความตรงกันของผู้ทรงคุณวุฒิ} = \frac{9.35}{10} = 0.94$$

ภาคผนวก ก

ตาราง 1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอายุและระดับคะแนนความพร้อมโดยรวม ทั้ง 3 ด้าน

อายุ	ระดับคะแนนความพร้อมโดยรวมทั้ง 3 ด้าน		รวมจำนวน ทุกกลุ่ม (ร้อยละ)
	มาก จำนวน (ร้อยละ)	มากที่สุด จำนวน (ร้อยละ)	
≤ 25 ปี	18 (72)	7 (28)	25 (100)
> 25 ปี	31 (56.4)	24 (43.6)	55 (100)
รวม	49	31	80

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 25 ปี มีระดับคะแนนความพร้อมโดยรวม ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 43.6 ซึ่งมีร้อยละมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี คือ ร้อยละ 28

ตาราง 2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามอาชีพและระดับคะแนนความพร้อมโดยรวม ทั้ง 3 ด้าน และทดสอบความแตกต่างด้วย ไค – สแควร์

อาชีพ	ระดับคะแนนความพร้อมโดยรวมทั้ง 3 ด้าน		รวมจำนวน ทุกกลุ่ม
	มาก จำนวน (ร้อยละ)	มากที่สุด จำนวน (ร้อยละ)	
รับจ้างและลูกจ้าง	22 (48.9)	23 (51.1)	45 (100)
ค้าขาย	16 (80.0)	4 (20.0)	20 (100)
ไม่ได้ประกอบอาชีพ	11 (73.3)	4 (26.7)	15 (100)
รวม	49	31	80

Chi - square = 6.78 ($p < .05$)

จากตาราง 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพรับจ้างและลูกจ้าง มีระดับคะแนนความพร้อมโดยรวม ทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 51.1 ซึ่งมีร้อยละมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพค้าขาย และไม่ได้ประกอบอาชีพ คือ ร้อยละ 20 และร้อยละ 26.7 ตามลำดับ และเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนความพร้อม โดยรวมทั้ง 3 ด้านกับอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามระดับการศึกษาและระดับคะแนนการยอมรับ โดยรวมทั้ง 5 ชั้น และทดสอบความแตกต่างด้วย ไค – สแควร์

ระดับการศึกษา	ระดับคะแนนการยอมรับ โดยรวมทั้ง 5 ชั้น		รวมจำนวน ทุกกลุ่ม
	มาก จำนวน (ร้อยละ)	มากที่สุด จำนวน (ร้อยละ)	
ต่ำกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษา	6 (31.6)	13 (68.4)	19 (100)
มัธยมศึกษา	3 (9.1)	30 (90.9)	33 (100)
สูงกว่ามัธยมศึกษา	2 (7.1)	26 (92.9)	28 (100)
รวม	11	69	80

Chi – square = 6.73 (p<.05)

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและสูงกว่ามัธยมศึกษา มีระดับคะแนนการยอมรับโดยรวม ทั้ง 5 ชั้นอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 90.9 และร้อยละ 92.9 ตามลำดับ ซึ่งมีร้อยละมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาด้านต่ำกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษา คือ ร้อยละ 68.4 และเมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับคะแนนการยอมรับ โดยรวมทั้ง 5 ชั้นกับระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตาราง 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนกับความพร้อมด้านร่างกาย และด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง

ความพร้อมด้านร่างกายและด้านจิตใจ	ความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุน (rxy)
ความพร้อมด้านร่างกาย	.306**
ความพร้อมด้านจิตใจ	.263*

**p<.01 *p<.05

จากตาราง 4 พบว่าความพร้อมด้านสิ่งสนับสนุนในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพร้อมด้านร่างกายและด้านจิตใจในการเลี้ยงทารกด้วยน้ำนมมารดาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ($r = .306, .263$)

ภาคผนวก ง

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ

- | | | |
|---------------------------|-----------|--|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล | ธนสุวรรณ | อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 2. อาจารย์รุจิรา | อินทรตุล | คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 3. อาจารย์ชูคนธร | สันติธรรม | รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 4. อาจารย์ดวงทิพย์ | เจริญยิ่ง | อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 5. คุณสุธาวัดี | ไชยอินคำ | หัวหน้างานห้องคลอด โรงพยาบาลนครพิงค์
จังหวัดเชียงใหม่ |

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ นามสกุล	นางสาวนงนุช ตันทะรา
วัน เดือน ปีเกิด	13 ตุลาคม 2513
ประวัติการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย โรงเรียนจักรคำคณาทร ปีการศึกษา 2532 สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2537
ประวัติการทำงาน	พ.ศ. 2537 - 2542 พยาบาลประจำการหอผู้ป่วยพิเศษสูติ-นรีเวช และแผนกทารกแรกคลอด โรงพยาบาลแมคคอร์มิค