

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์

การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ

ผู้เขียน

นางสาวทิวา ปารีคำ

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชสวน

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐา ควรประเสริฐ
อาจารย์ ดร. วีระนัน บัณฑิตย์

ประธานกรรมการ
กรรมการ

บทคัดย่อ

การปรับปรุงพันธุ์งาเพื่อใช้เป็นไม้ประดับ ได้ทำการศึกษาการปลูกเบรินเทียนสายพันธุ์งา การซักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยใช้รังสีแกมมา การซักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยสาร โคลชิชิน และ ผลของรังสีแกมนาและสาร โคลชิชินต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโนโซน ณ แปลงวิจัยพืช สวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปลูกเบรินเทียนงาจำนวน 12 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ SM 52 R line MKS-I-81192, SM 54 line MKS-I-81199, SM 57 R line MKS-I-81322, SM 66 line MKS-I-81099, SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, SM 74 line BR-8 Israel, SM 74 line Trs-9 yield Murty, SM 74 line P-23-8 NS Israel, SM 74 line Yuzhi No 2 และ SM 74 line NS 214 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ พบร่วม 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186 และ SM 74 line NS 214 ที่ให้ ตีดอก ลีกเล็บดอกด้านล่าง ความสูงข้อแรกริ้อกดอก ความสูงสุดท้าย การแตกกิ่ง และระยะเวลาในการออกดอก (ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนถึงออกบาน) ที่มีศักยภาพที่อาจนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงไม้ดอกไม้ประดับได้

การซักนำการกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมนา นำเมล็ดงาจำนวน 7 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, SM 74 line NS 214, จำเกอบ่าย, จำเกอพร้าว และ มะ. 3 ไปน้ำรังสีแกมนาที่ปริมาณรังสี 0, 30, 60 และ 90 Gy

โดยว่างแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ ผลของการฉายรังสีพบว่า รังสีแกรมไม่มีผลต่อสีดอกความสูง และระยะเวลาในการออกดอก ทั้งนี้ผลของรังสีที่ใช้มีผลต่อสายพันธุ์งาชินคิต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป ปริมาณรังสีที่ 30, 60 และ 90 Gy มีผลต่อสีดอกของสายพันธุ์ SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, อําเภอปาย และ นข. 3 ปริมาณรังสี 90 Gy มีผลต่อความสูงเฉลี่ยของสายพันธุ์ SM 74 line MKS-I-82186 และปริมาณรังสีที่ 30, 60 และ 90 Gy มีผลต่อระยะเวลาในการออกดอกของสายพันธุ์ SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line NS 214 และนข.3 อย่างไรก็ตามปริมาณรังสีไม่มีผลต่อสีกลีบดอกด้านล่าง ความสูงขึ้นแรกที่ออกดอก และการแตกกิ่งของงา จากรุ่น M1 เมื่อทำการทดสอบเบอร์เช่นเดิมความงอก และได้คัดเลือกพันธุ์มาได้ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์อําเภอปาย และนข. 3 ที่ระดับปริมาณรังสี 0, 30 และ 60 Gy และสายพันธุ์อําเภอพร้าว ที่ระดับปริมาณรังสี 0, 30, 60 และ 90 Gy มาปศุสัตว์ทดสอบพบว่ารังสีแกรมไม่มีผลต่อการแตกกิ่ง ระยะเวลาในการออกดอก ความสูงขึ้นแรกที่ออกดอก ความสูงสุดท้าย และอายุการนานของดอก แต่มีผลทำให้สีดอกและสีกลีบดอกด้านล่างของสายพันธุ์อําเภอปาย กล่าวคือ ทำให้ได้สีดอกที่หลากหลายขึ้น จากการเปรียบเทียบลักษณะต่าง ๆ กับรุ่น M1 พบว่า รุ่นใน M2 คงจะมีสีดอกในเนื้อสีเหลืองเกิดขึ้น

การศึกษาผลของโคลชิชินที่มีต่อการกลดสายพันธุ์ของงา พบว่า การให้สารละลายโคลชิชินที่ความเข้มข้น 0, 0.25, 0.50 และ 0.75 เบอร์เช่นเดิม โดยการหยดลงบนยอดของต้นกล้าอายุ 1 สัปดาห์ ของต้นงา 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์อําเภอปาย อําเภอพร้าว และ นข. 3 พบว่า เบอร์เช่นเดิม การลดชีวิต ความสูงเฉลี่ยขึ้นแรกที่ออกดอกมีแนวโน้มลดลง ระยะเวลาในการออกดอกเรกนานมากกว่าเดิม และขนาดดอกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารละลายโคลชิชินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม สารละลายโคลชิชินไม่มีผลต่อความสูงสุดท้ายเฉลี่ย สีดอก และสีกลีบดอกด้านล่างของงาทั้ง 3 สายพันธุ์

การศึกษาผลของรังสีแกรมมาและสารโคลชิชินต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโนไซม์ พบว่า การให้รังสีแกรมมาที่ปริมาณ 0, 30, 60 และ 90 Gy และการให้สารโคลชิชินที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.25, 0.50 และ 0.75 % แก่งา สายพันธุ์ อําเภอปาย อําเภอพร้าว และ นข. 3 พบว่า รังสีแกรมมาและสารโคลชิชินทุกระดับไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโนไซม์ของงาทุกสายพันธุ์ โดยจำานวนโครโนไซม์ $2n = 26$

Thesis Title Varietal Improvement of Sesame as Ornamental Crop

Author Miss Thiwa Pateekum

Degree Master of Science (Agriculture) Horticulture

Thesis Advisory Committee

Asst. Prof. Dr. Nuttha Kuanprasert

Chairperson

Lect. Dr. Weenun Bundithya

Member

Abstract

Varietal improvement of sesame as ornamental crop was conducted by comparing various sesame characteristics, inducing mutations using gamma ray, treating seeds with colchicine and effects of gamma ray and colchicine on chromosome number of sesame at field in Chiang Mai University.

Twelve selected sesame varieties, SM 52 R line MKS-I-81192, SM 54 line MKS-I-81199, SM 57 R line MKS-I-81322, SM 66 line MKS-I-81099, SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, SM 74 line BR-8 Israel, SM 74 line Trs-9 yield Murty, SM 74 line P-23-8 NS Israel, SM 74 line Yuzhi No 2 and SM 74 line NS 214 were tested for their characteristics. Completely randomized design (CRD) was employed with 15 replications. Four varieties, SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186 and SM 74 line NS 214, had some potential as ornamental plant by showing some good characteristics in terms of flower color, lower petal color, height of first flowering node, branching and flowering time.

Sesame seeds of SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, SM 74 line NS 214, Amphur Pai, Amphur Phrao and KKU.3 were exposed to gamma ray at different doses, 0, 30, 60 and 90 Gray (Gy). It was found that gamma ray had effect on flower color of SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 74 line MKS-I-82186, Amphur Pai and

KKU.3. Gamma ray at 90 Gy had effect on height of first flowering of SM 74 line MKS-I-82186. whereas gamma ray at 30, 60 and 90 Gy had an effect on time of flowering of SM 73 line MKS-II-82128-1, SM 73 R line MKS-II-82128-1, SM 74 line NS 214 and KKU.3. However, gamma ray did not have any effect on lower petal color, height of first flowering node and branching. These selected varieties of first radiated generation were planted for further investigation. It was found that gamma ray had no effect on plant height, day of flowering and branching. However, in this test, Amphur Pai radiated at 30 and 60 Gy showed yellow flower color.

Different concentrations of colchicine, 0, 0.25, 0.50 and 0.75 %, were applied on shoot tip of Amphur Pai, Amphur Phrao and KKU.3. It was found that the greater concentrations of colchicine resulted in the lower survival rate and plant height. Flowering period was delayed whereas flower size was increased.

Chromosome count was conducted from root tip of irradiated, 0, 30, 60 and 90 Gy and colchicine – treated, 0, 0.25, 0.50 and 0.75 %, germinating seeds. Radiation doses or colchicine concentrations had no effect on chromosome number. Number of chromosome of all roots yield 26 chromosomes. ($2n = 26$)