

บรรณานุกรม

- รายงานประจำปี 2547 โรงพยาบาลเชิงราชประชาชนุเคราะห์
รายงานประจำปี 2548 โรงพยาบาลเชิงราชประชาชนุเคราะห์
รุ่งทิวา หมื่นปา. การบริหารเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคไต (pharmaceutical care in patients with renal disease). *เภสัชกรรมคลินิก* 2542; 7 : 62-80
- รุ่งทิวา หมื่นปา, บัญญัติ สิทธิธัญกิจ , นันทนวล มัชฌิมอุบลรัตน์, วัฒนชัย สุแสงรัตน์. การศึกษาการสั่ง
ใช้ยาในผู้ป่วยที่มีภาวะไตบกพร่อง ที่มารับการรักษาที่ตึกอายุรกรรม โรงพยาบาล
ขอนแก่น.ใน *วิชัย โชควิวัฒน์ บรรณาธิการ. ผลงานวิชาการดีเด่น กระทรวงสาธารณสุข*
ปี 2538. เชียงราย : โรงพิมพ์อินเทอร์เน็ตพรินท์, 2538 :116-137
- รัชนิชัย ราชกิจ. “ การใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยใน แผนกอายุรกรรมโรงพยาบาลเชิงราชประชาชนุ
เคราะห์”.วิทยานิพนธ์ ปริญญาเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม ภาควิชา
เภสัชกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2542.
- วรรณดี เต้โสติถกุล. Clinical Pharmacokinetics consideration in patient with renal
diseases and dosage adjustment. *เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัช
กรรมคลินิก ครั้งที่ 1/2542 เรื่อง Advanced Biopharmaceutics and
Pharmacokinetics* 23-27 พฤศจิกายน 2541; ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว.เชียงใหม่
วิวรรณ อัครวิเชียร . แผนการรักษาด้วยยาและปัญหาที่เนื่องมาจากยา (Pharmacotherapy and
Drug Related Problems).ใน: *วิวรรณ อัครวิเชียร บรรณาธิการ. เภสัชกรรมคลินิก:
พิมพ์ครั้งที่ 1.*ขอนแก่น: หจก. ขอนแก่นการพิมพ์, 2541: 21-41
- ศูนย์ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา กระทรวงสาธารณสุข. Case report ceftazidime- induced acute interstitial
nephritis.ข่าวสารค้ายาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2546; 6 : 12-19
- สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย). Position Statement: การบริหารทางเภสัชกรรม
แก่ผู้ป่วยใน.ใน: สุวัฒนา จุฬาววัฒนทล, เนติ สุขสมบูรณ์ , ปรีชา มณฑาทิกุล ,
ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์ บรรณาธิการ.ระบบการให้ยาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัย
ของผู้ป่วย: พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด, 2548: 199 -204
- อุษา ฉายเกล็ดแก้ว. Integrating Pharmacoeconomics and Outcomes Research
into Pharmacy Practice.ใน: เนติ สุขสมบูรณ์, สุวัฒนา จุฬาววัฒนทล, ปรีชา มน
ฑาทิกุล บรรณาธิการ. *Advances in Pharmaceutical Care And*

Pharmacotherapeutics: พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน จำกัด, 2547: 182- 192

อากรณี ไชยคำ. Dosage of Drugs in Renal Failure and Dialysis. ใน: ธานี เมฆะสุวรรณ
คิษฐ์, ปรีชา มณฑานติกุล, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
บรรณาธิการ. **Textbook of pharmacotherapy** : พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัท
โฮลิสติก แพบลิชชิง จำกัด ,2546: 353-357.

อภิษฐา ชนะวงศ์. การปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. ใน: ธิดา นิงสานนท์, ปรีชา มณฑานติกุล
สุวัฒนา จุฬวัฒน์พล บรรณาธิการ. **คู่มือการใช้ยาสำหรับบุคลากรสาธารณสุข** : พิมพ์
ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน จำกัด, 2549: 335-360.

Aronoff GR, Berns JS, Brier ME, Golper TA, Morrison G, Singer I, Swan SK, Bennett
WM. **Drug Prescribing in Renal Failure** : Dosing Guidelines for
Adult. Fourth Edition. Philadelphia: American College of Physicians, 1999

Aweeka FT. Drug Dosing in Renal Failure. In: Koda- Kimble MA, Young LY,
Kradjan WA, eds. **Applied therapeutics: the clinical use of drugs**. 5th
ed. Vancouver: Applied therapeutics, Inc, 1992: 26.1 - 26.21

Bosker G .Penicillins & cephalosporins and related antibiotics. In Bosker G, eds.
Pharmatecture™ : Minimizing Medications to Maximize Results. 2th.
Missouri : Facts and Comparisons, 1999 :A 141 – A 177

Cantu TG, Ellerbeck EF, Yun SW , Castine SD, Kornhauser DM. Drug prescribing
for patients with Changing renal function. **Am J Hosp Pharm** 1992; 49:
2944-8

Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine.
Nephron 1976; 16: 31-41

Dechaux M, Gonzalez G, Broyer M. Plasma creatinine, and clearance and urinary
excretion of Creatinine in children. **Arch Fr Pediatr** 1978; 35:53-62

Falconnier AD, Haefeli WE, Schoenenberger RA, Surber C, Martin- Facklam M.
Drug dosage in Patients with renal failure optimized by immediate
concurrent feedback. **J Gen Intern Med** 2001;16:369-75

Goldberg DE, Baardsgaard G, Johnson MT, Jolowsky CM, Shepherd M, Peterson
CD. Computer Based program for identifying medication orders requiring
dosage modification based on renal function. **Am J Hosp Pharm**
1991;48: 1965-9

Golightly LK, O' Fallon CL, Moran WD, Sorocki AH. Pharmacist monitoring of drug
therapy in patients with abnormal serum creatinine levels. **Hosp Pharm**
1993; 28:725-7, 730-2

Guglielmo BJ. Principles of infection diseases. In: Koda-Kimble MA, Young LY, eds.
Applied Therapeutics: the clinical use of drugs. 7th ed. Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2001: 54.1-54.24.

Hepler CD, Strand LM. Opportunities and responsibilities in pharmaceutical care. **Am
J Hosp Pharm** 1990; 47 (3): 533-543.

Hems S. Renal disorders. in : Lee A, eds. **Adverse Drug Reactions** . 1th . London :
Pharmaceutical Press ,2001 : 99-118

- Higbee MD. The Geriatric Patient: General Physiologic and Pharmacologic Considerations. **Journal of Pharmacy Practice**.2000;8:250-262
- Hull JK, Hak LJ, Koch GC, et al. Influence of range of renal function and liver disease on predictability of creatinine clearance . **Clin Pharmacol Ther** 1981; 29:516-521
- Jelliffe RW. Creatinine clearances: bedside estimate. **Ann Intern Med** 1973; 79: 604-605
- Jelliffe RW. Estimation of creatinine clearance when urine cannot be collected. **Lancet** 1971; 1:975-976.
- Lam YW, Banerji S, Hatfield C, Talbert RL. Principles of drug administration in renal insufficiency. **Clin Pharmacokinet** 1997;32: 30-57.
- Mawer CE, Knowles BR, Lucas SB, et al. Computer – assisted prescribing of kanamycin For patients with renal insufficiency. **Lancet** 1972; 1 : 12-15
- Nankivell BJ. Creatinine clearance and the assessment of renal function. **Australian Prescriber** 2001 ; 24: 15- 17.
- Peterson JP, Colucci VJ, Schiff SE. Using serum creatinine concentrations to screen for inappropriate dosage of renally eliminated drugs. **Am J Hosp Pharm** 1991; 48:1962- 4.
- Robinson DC, Jaresko GS, Baker DE. Drug- induced Renal Disorder. In: Koda-Kimble MN, Young LY, Kradjan WA, eds. **Applied therapeutics: the clinical use of drugs**. 5th ed. Vancouver: Applied therapeutics, Inc; 1992: 27.1-27.15.
- Rovers JP. Identifying Drug Therapy Problems. In: Rovers JP, Currie JD, Hagel HP, McDonough RP, Sobotka JL, eds. **A Practical Guide to Pharmaceutical Care**. 2nd ed. Washington:
- Schwartz GJ. A simple estimate of glomerular filtration rate in children derived from body length and plasma creatinine. **Pediatrics** 1976;58 : 259-63
- Schwartz GJ. A simple estimate of glomerular filtration rate in full-term infants during the first year of life . **J pediatr** 1984; 104:849-854
- Tomechko MA, Strand LM, Morley PC, Cipolle RJ. Q and A from the pharmaceutical care project in Minnesota. **Am Pharm**. 1995; NS 35(4): 30- 9
- Tozer TN. Nomogram for modification of dosage regimens in patients with chronic renal impairment. **J Pharmacokinet Biopharm** 1974; 2 : 13-28
- Troutman WG. Drug – Induced Nephrotoxicity. In : Anderson PO, Knoben JE, eds. **Handbook of Clinical Drug Data**. 8th . Stamford : Appleton & Lange, 1997 : 668-675
- Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, Hamilton CW. Drug – Induced renal disease. In: Wells BG, DiPiro JT, Schwinghammer TL, Hamilton CW , eds. **Pharmacotherapy handbook**. 2th . Stamford : Appleton & Lange ,2000 : 991-994
- Welage LS ,Schultz RW , Schentag JJ. Pharmacokinetics of ceftazidime in patients with renal insufficiency. **Antimicrob Agents Chemother** 1984; 25: 201-204
- Wagner JG. **Fundamentals of clinical pharmacokinetics**. Hamilton(IL): Drug Intelligence Publications, 1975:162