

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| กิตติกรรมประกาศ | ก |
| บทคัดย่อภาษาไทย | ง |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ฉ |
| สารบัญตาราง | ญ |
| สารบัญภาพ | ฎ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา | 1 |
| วัตถุประสงค์ของการศึกษา | 3 |
| ขอบเขตการศึกษา | 3 |
| นิยามศัพท์เฉพาะ | 3 |
| ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา | 4 |
| บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 5 |
| ความรู้เรื่องโรคเอดส์และแนวทางการดูแลรักษา | 5 |
| ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส | 8 |
| ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัส | 10 |
| วิธีการวัดความร่วมมือในการใช้ยา | 14 |
| การศึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี | 16 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา | 21 |
| ประชากร | 21 |
| ระยะเวลาในการดำเนินการศึกษา | 21 |
| กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา | 21 |
| เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล | 22 |
| ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา | 23 |

| | หน้า |
|---|------|
| วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล | 25 |
| สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล | 28 |
| บทที่ 4 ผลการศึกษาและการอภิปรายผล | 30 |
| ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง | 30 |
| ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีการวัดความร่วมมือในการใช้ยาที่แตกต่างกัน 4 วิธี | 38 |
| ส่วนที่ 3 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสจากวิธีการวัดทั้ง 4 วิธี | 40 |
| ส่วนที่ 4 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีการวัดความร่วมมือในการใช้ยาที่แตกต่างกัน 4 วิธีกับผลลัพธ์ทางคลินิก | 41 |
| 4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยากับปริมาณ CD4 | 41 |
| 4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยากับปริมาณไวรัสในกระแสเลือด (Viral Load) | 44 |
| บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ | 47 |
| อภิปรายผลการศึกษา | 47 |
| ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ | 54 |
| ข้อจำกัดในการศึกษา | 55 |
| ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป | 55 |
| เอกสารอ้างอิง | 56 |
| ภาคผนวก ก แบบเก็บข้อมูลทั่วไป | 60 |
| ภาคผนวก ข แบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโรคและการรักษา | 64 |
| ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัส | 66 |
| ภาคผนวก ง หนังสือแสดงความยินยอม | 70 |
| ประวัติผู้เขียน | 71 |

สารบัญตาราง

| ตาราง | หน้า |
|--|------|
| 2.1 ยาต้านไวรัสเอดส์ที่มีใช้ในปัจจุบัน | 8 |
| 2.2 แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในผู้ใหญ่ที่ยังไม่มีอาการ โดยพิจารณาจากค่า CD4 | 8 |
| 4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัสที่เข้าร่วมในการศึกษา | 31 |
| 4.2 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม และการช่วยเหลือดูแลของครอบครัว | 33 |
| 4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับยาต้านไวรัสของกลุ่มตัวอย่าง | 35 |
| 4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเตือนการรับประทานยาต้านไวรัส และสาเหตุการลืมรับประทานยาต้านไวรัสของกลุ่มตัวอย่าง | 37 |
| 4.5 ความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสที่ได้จากการใช้วิธีการวัดที่แตกต่างกัน 4 วิธี | 38 |
| 4.6 เปรียบเทียบคะแนนความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีต่าง ๆ กัน กับผลการศึกษาร่วมอื่น | 39 |
| 4.7 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีการวัดความร่วมมือ ในการใช้ยา 4 วิธี | 40 |
| 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีการวัดความร่วมมือ ในการใช้ยาทั้ง 4 วิธีเปรียบเทียบกับ ค่า CD4 หลังการศึกษา | 41 |
| 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาที่มีการปรับตัวแปรกับค่า CD4 หลังการศึกษา | 42 |
| 4.10 แจกแจงค่าความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ กับการเปลี่ยนแปลง จำนวน CD4 ก่อนและหลังการศึกษา | 43 |
| 4.11 แจกแจงค่าความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ กับปริมาณไวรัส ในกระแสเลือดหลังการศึกษา | 44 |
| 4.12 แจกแจงค่าความร่วมมือในการใช้ยาที่วัดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ กับการเปลี่ยนแปลง ปริมาณไวรัสในกระแสเลือด | 45 |
| 4.13 ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสด้วยวิธีต่าง ๆ กับปริมาณไวรัสในกระแสเลือดหลังการศึกษา | 46 |

สารบัญภาพ

| ภาพ | หน้า |
|--|------|
| 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา | 24 |
| 4.1 ลักษณะการกระจายของข้อมูลความร่วมมือในการใช้ยาที่ได้จากวิธีการวัดความร่วมมือในการใช้ยา 4 วิธี | 44 |

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved