ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ปัจจัยทำนายความเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา

ผู้เขียน นายพฤฒิศักดิ์ จันทราทิพย์

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ คร. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ ประชานกรรมการ อาจารย์สิริลักษณ์ วรรชนะพงษ์ กรรมการ

บทคัดย่อ

การดูแลเด็กออทิสติกที่ยาวนานอาจก่อให้เกิดปัญหาความเครียดในมารดาที่ดูแลเด็ก ออทิสติกได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย เพื่อศึกษาความเครียดใน การดูแลเด็กออทิสติกของมารดา และปัจจัยทำนายกวามเครียดในการดูแลเด็กออทิสติกของมารดา กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาเด็กออทิสติกที่ให้การดูแลเด็กออทิสติก เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ที่ พาบุตรมารับบริการที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 214 ราย เลือก กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เก็บข้อมูลระหว่างมกรากมถึงเมษายน พ.ศ. 2552 เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยประกอบด้วย 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคกล ส่วนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมของบุตรและความรุนแรงของอาการออทิสติก ส่วนที่ 3 แบบวัดความเครียดในการดูแล ของมารดาเด็กออทิสติก ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ส่วนที่ 5 แบบสอบถาม ความพร้อมในการดูแลของผู้ปกครองเด็กออทิสติก และส่วนที่ 6 แบบวัดภาวะสุขภาพจิตของ มารดาเด็กออทิสติก เครื่องมือเหล่านี้ได้รับการทดสอบค่าความเชื่อมั่นมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาคอยู่ระหว่าง .84 - .97 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และหาอำนาจในการ ทำนายโดยใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ผลการวิจัยพบว่า

E MAI

- 1. ร้อยละ 49.53 ของมารดาเด็กออทิสติกมีความเครียดในการดูแลระดับปานกลาง
- 2. ภาวะสุขภาพจิตของมารคาเด็กออทิสติก ความรุนแรงของโรคออทิสติก ระยะเวลา ในการคูแลเด็กออทิสติก และความพร้อมในการคูแลเด็กออทิสติก สามารถร่วมกันทำนาย ความเครียดในการคูแลเด็กออทิสติกได้ร้อยละ 40.00
- 3. ภาวะสุขภาพจิตของมารดาเด็กออทิสติก มีอำนาจในการทำนายความเครียดในการ ดูแลเด็กออทิสติกมากที่สุด (ร้อยละ 30.20) รองลงมาได้แก่ ความรุนแรงของโรคออทิสติก (ร้อยละ 5.9) ระยะเวลาในการดูแลเด็กออทิสติก (ร้อยละ 2.8) และความพร้อมในการดูแล (ร้อยละ 1.1) ตามลำคับ

ผลการวิจัยกรั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ภาวะสุขภาพจิตของมารดาเด็กออทิสติก เป็นปัจจัย ทำนายที่สำคัญต่อความเครียดในการคูแลเด็กออทิสติก ดังนั้นในการคูแลเด็กออทิสติก ทีมผู้รักษา ไม่ควรมองข้ามการให้การส่งเสริมสุขภาพจิตของมารดาเด็กออทิสติก ควบคู่ไปกับการคูแลเด็ก ออทิสติกต่อไป

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title Predicting Factors of Stress in Caring for Autistic Children

Among Mothers

Author Mr. Phuetthisak Chantratip

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

Thesis Advisory Committee

Associate Professor Dr. Patraporn Tungpunkom Chairperson
Lecturer Siriluck Vadtanapong Member

ABSTRACT

Long term care of children with autism can create stress on the mothers. This predictive correlational study aimed to investigate the predicting factors related to stress in mothers of autistic children. The sample was mothers of autistic children who took care of their children for at least 6 months and received service at the Rajanagrindra Institute of Child Development in Chiang Mai. A total of 214 mothers of children with autism were selected through purposive sampling and data collection occurred during January to April 2009. The research instruments consisted of six parts: 1) the Demographic Data Form, 2) the Children Behavior and the Severity of Autism 3) the Parenting Stress in Mothers of Children with Autism 4) the Personal Resource Questionnaire (PRQ2000) 5) the Parenting Preparedness of Mothers of Children with Autism and 6) the Mental Health Inventory. All instruments were tested for reliability and had Cronbach's alpha coefficient ranging between .84 - .97. Data were analyzed using descriptive statistics and stepwise multiple regression.

Results indicated that:

Sto MA

- 1. Forty nine point five three percent of mothers of autistic children had stress in caring at a moderate level.
- 2. The mental health status of mothers of children with autism, the severity of autism, duration of caring for autistic children and the readiness of caring children with autism were accounted for 40.00% of predictors of stress in caring for children with autism.
- 3. The mental health status of mothers of children with autism was the most significant predictor of stress in caring for children with autism (30.20%) following by the severity of autism (5.9%), duration of caring for autistic children (2.8%), and the readiness of caring children with autism (1.1%), respectively.

The findings from this study show that the mental health status of mothers of children with autism was the most important predicting factor of stress in caring the children with autism. Therefore, in caring of autistic children, the health care team should not overlook to enhance the mental health of mothers of children with autism and caring of autistic children simultaneously.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright[©] by Chiang Mai University All rights reserved