ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์	การใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อกำจัดเชื้อรา	Aspergillus	<i>flavus</i> ที่ติดมากับ
	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด		

ผู้เขียน นาย กรกิตติ์ เฉลยถ้อย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ปริญญา

รองศาสตราจารย์ศุภศักดิ์ ลิมปิติ

อาจารย์ ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

## บทคัดย่อ

การใช้คลื่นความถิ่วิทยุที่ 27.12 MHz เพื่อทำลายเชื้อรา Aspergillus flavus ในเมล็คพันธุ์ ข้าวโพค พบว่า ที่อุณหภูมิ 50 60 และ 70 °C ความร้อนจากRF มีผลลบต่อคุณภาพของเมล็คพันธุ์ ยิ่ง เมล็คถูกทำให้ร้อนนานขึ้นผลเสียยิ่งสูงขึ้น แต่ความร้อนจากอุณหภูมิ 3 ระดับข้างต้น ไม่มี ผลกระทบต่อเชื้อราเลย อย่างไรก็ตาม ที่ 80 °C ความร้อนจาก Radio Frequency สามารถทำให้เชื้อ ราลคลงได้บางส่วน การให้ความร้อน 80 °C เป็นเวลา 4, 5, 6, 7 และ 8 นาที ทำให้เชื้อราลคลงจาก 100% เป็น 23.7, 6.2, 14.6, 19.5 และ 40.8% ตามลำดับ การให้ความร้อนที่อุณหภูมินี้ ไม่ทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงองก์ประกอบทางเคมีของเมล็ค แต่คุณภาพการเป็นเมล็คพันธุ์จะสูญเสียไปโดย สิ้นเชิง ดังนั้นการใช้เทคนิคคลื่นวิทยุในการทำลายเชื้อรา จึงไม่เหมาะกับเมล็คพันธุ์ข้าวโพค แต่ เทคนิคนี้น่าจะใช้ได้กับเมล็คที่จะใช้เป็นอาหารสัตว์

**ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่** Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved

Thesis Title	Use of Radio Frequency to Eradicate	Use of Radio Frequency to Eradicate Aspergillus flavus Associated with		
	Corn Seed			
Author	Mr. Korrakitt Chaloeithoi			
Degree	Master of Science (Post harvest techn	Master of Science (Post harvest technology)		
Thesis Advisory	Committee			
	Assoc. Prof. Supasark Limpiti	Chairperson		

Lect. Natthasak Kristikames

Member

## Abstract

Radio frequency (RF) at 27.12 MHz was used to eradicate *Aspergillus flavus* fungi in corn seeds. It was found that at temperature 50 60 and 70 °C quality of the seed was affected by the heat of the Radio Frequency. The longer the heating the greater the adverse effect. Yet, the 3 temperature levels showed no harm on *A flavus*. Nonetheless, at 80 °C the RF heating could reduce the amount of *A flavus* on the corn seeds to some degree depending of the duration of RF application. Heating at 80 °C for 4, 5, 6, 7 and 8 minutes had decreased the *A flavus* infection from 100% to be 23.7, 6.2, 14.6, 19.5 and 40.8% respectively. In this treatment no changes in chemical composition of the seeds was observed but the seed quality had completely been destroyed. RF heating technique seems to be not suitable for fungi eradication in corn seeds but the technique might be usable in grain that is aimed to be utilized as feed.

ลิ<mark>ปสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</mark> Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved