**ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ** การวิเคราะห์สถานการณ์การคูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่

ผู้เขียน นายปราโมทย์ มังกรณ์

**ปริญญา** พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช)

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

อาจารย์ คร. หรรษา เศรษฐบุปผา

## บทคัดย่อ

การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และกลับไปเสพซ้ำสูงขึ้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์สถานการณ์การดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลแพร่ ตามแนวคิดของ โดนาบีเดียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้านได้แก่ โครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ของการดูแล กลุ่มตัวอย่าง เลือกแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้ที่เป็นโรคติดสุรา 10 คน 2) ญาติหรือผู้ดูแล 10 คน 3) แกนนำชุมชน 10 คน และ4) บุคลากรทีมสุขภาพ 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบประเมินปัญหาการคื่มสุรา 3) แบบสอบถามการ รับรู้การดูแล และ4) แนวคำถามในการสัมภาษณ์รายบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำมา จัดหมวดหมู่

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

ด้านโครงสร้างพบว่า 1) ไม่มีนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณเฉพาะ สำหรับการดูแลผู้ที่เป็นโรคติดสุรา 2) อัตรากำลังไม่เพียงพอ 3) ไม่มีกู่มือ มาตรฐานการดูแลผู้ที่เป็นโรค ติดสุรา 4) มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา และเวชภัณฑ์เพียงพอ และ 5) สถานที่ในการให้การดูแลผู้ที่เป็น โรคติดสุราในหอผู้ป่วยอยู่ในบริเวณเดียวกับการดูแลผู้ป่วยฝ่ายกาย ด้านกระบวนการ พบว่า การคูแลของทีมสุขภาพ ได้แก่ 1) การประเมินคัดกรองแต่ ไม่ครอบคลุม ทุกหน่วยบริการ 2) การบำบัดฟื้นฟูสภาพ และ3) กระบวนการส่งต่อและติดตามผู้ที่เป็น โรคติดสุรา

การคูแลของญาติหรือผู้คูแล ได้แก่ 1) การคูแลด้านร่างกายเหมาะสม 2) การคูแลด้าน จิตใจน้อย และ3) การให้คำแนะนำที่เหมาะสม

การคูแลของแกนนำชุมชน ได้แก่ 1) การให้คูแลช่วยเหลือและให้คำแนะนำน้อย และ
2) ไม่มีความรู้และไม่ตระหนักว่าโรคติดสุราเป็นปัญหาของชุมชน

ด้านผลลัพธ์หลังเข้ารับบริการ ได้แก่ 1) ผู้ที่เป็นโรคติดสุราไม่มีการเปลี่ยนแปลงความรู้ เกี่ยวกับสาเหตุการเป็นโรคติดสุรา 2) ผู้ที่เป็นโรคติดสุรามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่มสุราเพียง เล็กน้อย 3) ผู้ที่เป็นโรคติดสุรามีการรับรู้การดูแลอยู่ในระดับดี และ4) ญาติหรือผู้ดูแลมีการรับรู้การ ดูแลอยู่ในระดับดี

ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ที่ เป็นโรคติดสุรา เพื่อส่งเสริมคุณภาพการดูแลให้มีประสิทธิภาพต่อไป



Independent Study Title Situational Analysis of Caring for Persons with Alcohol Dependence,

Psychiatric Clinic, Phrae Hospital

Author Mr. Pramote Mungkorn

Degree Master of Nursing Science (Mental Health and Psychiatric Nursing)

**Independent Study Advisor** 

Lecturer Dr. Hunsa Sethabouppha

## **ABSTRACT**

Continuous care for persons with alcohol dependence (PAD) is provided at the Psychiatric Clinic, Phrae Hospital; however, the number of PAD and incidences of relapses have increased. This study aimed to examine the situation of caring for PADs at Psychiatric Clinic, Phrae Hospital. The study was developed based on Donabedian's concept, which comprised of 3 components: structure, process and outcome. The samples was purposively selected and consisted of 4 groups: 1) ten PADs, 2) ten PADs relatives or PADs caregivers, 3) ten community leaders, and 4) nine health care personnel. The instruments used for data collection were: 1) a demographic data questionnaire, 2) the Alcohol Use Disorders Identification Test, 3) Perception of Care Scale, and 4) individual interview guidelines. Data were obtained between April and May, 2013 and were analyzed using descriptive statistics. Data from interviews were categorized.

Results of the study were as follows:

Structure: The study found that the hospital had: 1) no specific policy, implementation plan, performance indicators and budget used in caring for PADs 2) insufficient health care personnel, 3) no caring for PADs guidelines, 4) sufficient equipments, medical materials and medical supplies, and 5) a inpatient unit for PADs located in the same area as general patients.

Process: The study found that the care process of health care personnel included: 1) a screening process for PADs but was not conducted in all clinics, 2) a rehabilitation process, and 3) a referral and monitoring process.

The care process for PADs relatives or PADs caregivers included: 1) providing proper physical care, 2) providing some psychological support, and 3) giving proper advices.

The care process of community leaders included: 1) providing some supports and advices, and 2) lacking of knowledge and awareness that alcohol dependence is a community problem.

Outcome: The study found that after receiving care: 1) PADs experienced no change in knowledge about the causes of alcohol dependence, 2) PADs made slightly changes to their alcohol drinking behaviors, 3) PADs perceived that they received care at a good level, and 4) PADs relatives or PADs caregivers perceived care at a good level.

The results of this study could be used as basic information for the development of effective and appropriate quality of care program for PADs.

## ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved