

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
ABSTRACT	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
สารบัญภาพ	ฎ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
วัตถุประสงค์ของการศึกษา	8
คำถามการศึกษา	9
ขอบเขตการศึกษา	10
นิยามศัพท์	10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	12
กระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุ	13
อาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก	21
สาระของแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก	42
การนำแนวปฏิบัติทางคลินิกไปใช้และการประเมินผล	49
กรอบแนวคิดในการศึกษา	54
บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา	55
ลักษณะประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	55
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา	56
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	57
การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง	58

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ขั้นตอนการดำเนินการศึกษา	58
การวิเคราะห์ข้อมูล	64
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล	65
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	65
การอภิปรายผล	77
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ	84
สรุปผลการศึกษา	84
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้	85
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป	86
เอกสารอ้างอิง	87
ภาคผนวก	96
ภาคผนวก ก เอกสารรับรองโครงการวิจัย	97
ภาคผนวก ข เอกสารอนุญาตให้ใช้เครื่องมือวิจัย	102
ภาคผนวก ค เอกสารอนุญาตดำเนินการวิจัย/เก็บข้อมูลในคณะแพทยศาสตร์	103
ภาคผนวก ง เอกสารคำชี้แจงแก่อาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วม โครงการการศึกษา	104
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล	113
ภาคผนวก ฉ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ	120
ประวัติผู้เขียน	121

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 4.1 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลตามปกติและกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ จำแนกตามข้อมูลทั่วไป	67
ตารางที่ 4.2 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลตามปกติและกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ จำแนกตามรายละเอียดเกี่ยวกับโรคการผ่าตัด	69
ตารางที่ 4.3 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก จำแนกตามข้อมูลทั่วไป	71
ตารางที่ 4.4 เปรียบเทียบสัดส่วนจำนวนผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกที่มีระดับความรุนแรงของอาการปวดระดับต่างๆ ในวันที่ 1, 2 และ 3 หลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามปกติกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ	73
ตารางที่ 4.5 เปรียบเทียบจำนวนครั้ง ค่าเฉลี่ยของยาระงับปวดทั้งชนิดฉีดและชนิดรับประทานที่ได้รับในวันที่ 1, 2 และ 3 หลังผ่าตัดระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามปกติกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ	74
ตารางที่ 4.6 เปรียบเทียบข้อมูลระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามปกติกับกลุ่มที่ได้รับการดูแลตามแนวปฏิบัติทางคลินิกฯ จำแนกเป็นจำนวนและร้อยละ	75
ตารางที่ 4.7 ข้อมูลความพึงพอใจของทีมผู้ใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกฯ สำหรับการจัดการอาการปวดในผู้สูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพก จำแนกเป็นจำนวนและร้อยละ	76

สารบัญภาพ

หน้า

ภาพที่ 2.1 การส่งสัญญาณอาการปวดระหว่างไขสันหลังและสมอง

27



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved