

หัวข้อการค้นคว้าแบบอิสระ

การทำนายและประเมินปัจจัยเสี่ยงในการกระทำผิดของ
ผู้ป่วยโรคจิตเภท

ผู้เขียน

นางสาวณัฐชนรรณ ใจเย็น

ปริญญา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

รศ. นพ. ณรงค์ มณีทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อหาอุบัติการณ์ของพฤติกรรมทำผิดกฎหมายในผู้ป่วยโรคจิตเภท และปัจจัยนำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำผิดในผู้ป่วยโรคจิตเภท เพื่อหาความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการกระทำผิดของผู้ป่วยโรคจิตเภท โดยทำการวิจัยในผู้ป่วยในทุกรายที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 92 ราย มีผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการศึกษาจนจบการประเมิน 73 ราย (ร้อยละ 79.7) ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยที่ถูกแจ้งความเป็นผู้ป่วยคดีจำนวน 1 ราย (ร้อยละ 1.4) และมีผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เข้าข่ายเป็นผู้ป่วยคดีหากมีการแจ้งความจำนวน 11 ราย (ร้อยละ 15.1) เนื่องจากการศึกษายังมีจำนวนผู้ป่วยเข้าร่วมจำนวนน้อย เมื่อทำการวิเคราะห์ทางสถิติ ยังไม่พบความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทำผิดกฎหมายหรือเสี่ยงต่อพฤติกรรมทำผิดกฎหมาย ในผู้ป่วยโรคจิตเภททั้งสองกลุ่ม แม้ว่าจากการศึกษาดังกล่าวยังไม่พบปัจจัยนำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือกระตุ้นให้เกิดการกระทำผิดในผู้ป่วยโรคจิตเภท แต่บุคลากรทางการแพทย์ กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย ควรตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงต่อการเกิด ความก้าวร้าวรุนแรงดังกล่าว ที่อาจนำไปสู่การเกิดคดีต่อไป และควรได้มีการศึกษาวิจัยโดยเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากกว่านี้

Independent Study Title Forecasting and Evaluating the Risk Factors of Offense in Schizophrenic Patients

Author Ms. Natthanan Jaiyen

Degree Master of Science (Forensic Science)

Advisor Assoc. Prof. Narong Maneeton, M.D.

ABSTRACT

The purposes of this study were to determine the prevalence rate and associated factors of offense in schizophrenic patients. Seventy-three schizophrenic patients admitted at Suanprung hospital between January 2014 and May 2014 were included and evaluated. This findings showed that prevalence rate of offense was 1.4%. However, those patients with risk to take offense was as high as 15.1%. Significant associated factors of offense in those patients were not found. In summary, this study suggests that the prevalence rate of offense in schizophrenia. Was quite low. This study was also not found the associated factors of offense in those patients. However, further studies with large sample size should be conducted to confirm this findings.