

## เอกสารอ้างอิง

- [1] แสง บุญเฉลิมวิภาส., “กฎหมายสุขภาพจิต มาตรการบังคับรักษาผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 14 (2549) : 207-212.
- [2] กอบ โขศ จวงษ์, สมชาย จักรพันธุ์, มล., “ผลกระทบข่าวความรุนแรงในโรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานคร ต่อผู้ป่วยโรคจิตเภทและญาติ”. วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย, 14 (2549) : 1-23.
- [3] หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ. สาลจำคุก 'เปมิกา' 4 ปี 6 เดือน. [ระบบออนไลน์]. เว็บไซต์ <http://www.thairath.co.th/today/view/122073> (27 ตุลาคม 2553)
- [4] ชลดา เชี่ยวชาญ, กุลพล พลวัน และอุทัย อาทิวะ. “วิธีการเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตที่จะก่อเหตุร้ายแก่สังคม”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2555
- [5] สมภพ เรื่องตระกูล. “โรคจิตเภท Schizophrenia”. ในคู่มือจิตเวชศาสตร์. หน้า 66. กรุงเทพฯ : อักษรสัมพันธ์, 2524.
- [6] สุวรรณ อรุณพงศ์ไพศาล. “การวินิจฉัยโรคและการวินิจฉัยแยกโรค”. ในตำราโรคจิตเภท Textbook of Schizophrenia. หน้า 109. สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2552.
- [7] American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed., text rev.). Washington, DC 2000
- [8] Large, M., Smith, G. and Nielssen, O., “The relationship between the rate of homicide by those with schizophrenia and the overall homicide rate: A systematic review and meta-analysis”. Schizophrenia Research, 112 (2009) : 123-129.

- [9] Mao, S., Peng, Y., Zhi, G., Lai, C. W., Yu, E. H., Cui, P., Wen, J., Lamberti, J. S. and Conwell, Y., “Criminal behavior among persons with schizophrenia in rural China”. *Schizophrenia Research*, 122 (2010) : 213-218.
- [10] Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H. and Simonsen, E., “Risk factors for violence among patients with schizophrenia”. *Clinical Psychology Review*, 31 (2011) : 711-726.
- [11] Laajasalo, T., Salenius, S., Lindberg, N., Repo-Tiihonen, E. and Häkkänen-Nyholm, H., “Psychopathic traits in Finnish homicide offenders with schizophrenia”. *International Journal of Law and Psychiatry*, 34 (2011) : 324-330.
- [12] Bo, S., Abu-Akel, A., Kongerslev, M., Haahr, U. H. and Simonsen, E., “Risk factors for violence among patients with schizophrenia”. *Clinical Psychology Review*, 31 (2011) : 711-726.
- [13] Golenkov, A., Large, M., Nielsen, O. and Tsymbalova, A., “Characteristics of homicide offenders with Schizophrenia from the Russian Federation”. *Schizophrenia Research*, 133 (2011) : 232-237.
- [14] Byoung, H., Jeong, H., Sohee, O., Sang, S., Sung, H. and Sun, B., “Clinical features of parricide in patients with schizophrenia”, *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 46 (2012) : 621-629.
- [15] Morgan, V. A., Morgan, F., Valuri, G., Ferrante, A., Castle, D. and Jablensky, A., “A whole-of-population study of the prevalence and patterns of criminal offending in people with schizophrenia and other mental illness”. *Psychological Medicine*, 1 (2013) : 1-12.
- [16] Özcan B, A. Pieter Kappetein, Ad J.J.C. Bogers. Charlson comorbidity index as a predictor of long-term outcome after surgery for nonsmall cell lung cancer. *Eur J Cardiothorac Surg* 2005;28 : 759-762.