

หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น

ผู้เขียน นางสาวนภศพร ชัยมาโย

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์)

คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรัตน์ เจริญสันติ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
รองศาสตราจารย์ ดร.พรณพิไล ศรีอาภรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

บทคัดย่อ

การฝากครรภ์เป็นบริการสุขภาพ ในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น โดยอายุครรภ์ที่ฝากครรภ์ครั้งแรกมีความสำคัญต่อการลดภาวะแทรกซ้อน การวิจัยเชิงพรรณนาหาความสัมพันธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ การสนับสนุนทางสังคม และการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างคือ สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี ที่ฝากครรภ์ครั้งแรก หรือพึงผลตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรก ณ แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลปราสาท และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 123 คน ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือน มีนาคม 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามการรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์และแบบสอบถามการรับรู้อุปสรรคของฝากครรภ์ ของบริด มัลเลน เซลวินและลอไรมอร์ (Byrd, Mullen, Selwyn, & Lorimor, 1996) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยโดยพิชยภิญญา โญ (Pichayapinyo, 2005) และดัดแปลงให้เหมาะสมกับสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นโดยผู้วิจัย และแบบสอบถามพฤติกรรมกรรมการสนับสนุนทางสังคม ดัดแปลงโดยมะลิวรรณหมั่นแก้วกล้าวิจิต (2551) และแบบบันทึกการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น มีอายุครรภ์เฉลี่ย 18.09 สัปดาห์ (SD = 7.85)
2. การรับรู้ประโยชน์ของการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 48.48 (S.D. = 4.73)
3. การรับรู้อุปสรรคของการฝากครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับน้อย มีคะแนนเฉลี่ย 13.28 (S.D. = 4.46)
4. การสนับสนุนทางสังคมของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 58.99 (S.D. = 9.24)
5. การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ำกับอายุครรภ์ที่เริ่มฝากครรภ์ครั้งแรกของสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($r = -.234, p < .01$)

ผลการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมให้สตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อย



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved

Thesis Title Factors Related to Prenatal Care Among Adolescent Pregnants

Author Ms. Napasaporn Chaimayo

Degree Master of Nursing (Midwifery)

Advisory Committee Asst. Prof. Dr. Jantararat Chareonsanti Advisor
Assoc. Prof. Dr. Punpilai Sriarporn Co-advisor

ABSTRACT

Prenatal care is the health service for preventative health care and promoting a healthy lifestyle for pregnant women. It is important for adolescent pregnant women to begin prenatal care at the start of their pregnancy to decrease complications. The main purpose of descriptive research was to investigate the relationship between the perceived benefits of prenatal care, the perceived barriers of prenatal care, social support, and prenatal care among adolescent pregnant women. The sample included 123 adolescent pregnant women age 18 years old or under who were enrolling for the first time to prenatal care clinics at Surin Hospital, Prasart Hospital, and Buriram Hospital between October 2015 and March 2016. The research instruments used were Perceived Benefits of Prenatal Care Scale and Perceived Barriers to Prenatal Care Scale (Byrd, Mullen, Selwyn, & Lorimor, 1996) which was translated into Thai by Pichayapinyo (2005) and modified appropriately for adolescent pregnant women by the researcher; Social Support Questionnaire by Maliwan Muenkleawklavichit (2008); and Prenatal Care Record for adolescent pregnant women developed by the researcher. Data were analyzed using descriptive statistics and Spearman rank correlation coefficient.

The results of the study were as follows:

1. Prenatal care among adolescent pregnant which the mean gestational age was 18.09 weeks (S.D. = 7.85).
2. There was a high level of perceived benefits of prenatal care among adolescent pregnant in which the mean score was 48.48 (S.D. = 4.73).
3. There was a low level of perceived barrier of prenatal care among adolescent pregnant in which the mean score was 13.28 (S.D. = 4.46).
4. There was a good level of social support among adolescent pregnant in which the mean score was 58.99 (S.D. = 9.24).
5. Social support had a low negative score which correlated with the gestational age of the pregnant adolescent during their first visit to prenatal care ($r = -.234, p < .01$)

The results of this study can be used as baseline data for promoting prenatal care for adolescent pregnant at an early gestational age.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved