หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็ก

โรคปอดอักเสบซ้ำ

ผู้เขียน นางสาวสุทธินี สุปรียาพร

ปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)

**คณะกรรมการที่ปรึกษา** รองศาสตราจารย์ คร.พัชราภรณ์ อารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

รองศาสตราจารย์สุธิศา ล่ามช้าง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

## บทคัดย่อ

การกลับเป็นโรคปอดอักเสบซ้ำในเด็กยังคงเป็นปัญหาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พฤติกรรมการ คูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการป้องกันการเกิด โรคปอดอักเสบซ้ำได้ การวิจัยเชิงพรรฉนาแบบหาความสัมพันธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม การคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ที่มีอายุ ระหว่าง 1-5 ปี จำนวน 85 คน และมารับการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลแพร่ และโรงพยาบาลพะเยา ระหว่างเดือนกันยายน พ.ส. 2559 ถึงเดือนเมษายน พ.ส. 2560 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามพฤติกรรมการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ และ แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ประกอบด้วย การรับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ การตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของเกรื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีค่า ดัชนีความตรงของเนื้อหาเท่ากับ .93, .92 และ .97 ตามลำคับ การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาลได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80, .80 และ .81ตามลำคับ วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันข้อมูแบบสอบถามโดยใช้สถิติพรรณนาและหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สเตอเปาแบบพียร์สัน

## ผลการวิจัยพบว่า

- 1. ผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ ร้อยละ 84.7 มีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการคูแลของผู้คูแลเด็ก โรคปอดอักเสบซ้ำอยู่ในระดับสูง โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 101.7 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.5
- 2. การรับรู้ความรุนแรงของ โรคปอดอักเสบในเด็ก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการ คูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = .518, p < .01) การรับรู้อุปสรรค ของการปฏิบัติในการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการ คูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r = -.312, p < .01)</p>

ผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการคูแลของผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำการ รับรู้ความรุนแรงของโรคปอดอักเสบในเด็ก และการรับรู้อุปสรรคของการปฏิบัติในการคูแลของ ผู้คูแลเด็กโรคปอดอักเสบซ้ำ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคปอดอักเสบในเด็ก ข้อมูลนี้สามารถ นำไปใช้เป็นแนวทางในการคูแลและป้องกันโรคปอดอักเสบซ้ำในเด็กของผู้คูแลต่อไป

> ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved

**Thesis Title** Factors Related to Caring Behaviors Among Caregivers of Children

with Recurrent Pneumonia

**Author** Miss Suttinee Supreeyaporn

**Degree** Master of Nursing Science (Pediatric Nursing)

Advisory Committee Associate Professor Dr. Patcharaporn Aree Advisor

Associate Professor Suthisa Lamchang Co-advisor

## **ABSTRACT**

Among children in Thailand, recurrent pneumonia is still a common problem and an increasing trend. Good caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia is the most effective way to prevent recurrent pneumonia. The purpose of this descriptive correlational study was to examine caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia and factors related to caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia. The participants of this study included parents of children with recurrent pneumonia ages 1 - 5 years old who attended the out-patient-departmeants at the following hospitals located in Northern Thailand: Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Lampang Hospital, Chiang Rai Prachanukroh Hospital, Phrae Hospital, and Phayao Hospital. Data were collected from September 2016 to April 2017. The study instruments were composed of three questionnaires about the following topics: 1) the caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia and the related factors of caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia, 2) the perceived severity of pneumonia in children and 3) the perceived barrier of caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia. The content validity of all three questionnaires were confirmed to be valid by a panel of experts with, scores of .93, .92 and .97, respectively. The reliability of the questionnaires was also tested. The Cronbach's alpha coefficients of the questionnaire were .80, .80 and .81, respectively.

Data were analyzed using descriptive statistics, and the Pearson Product Moment Correlation Coefficient.

The results of this study showed that:

- 1. Eighty-four point seven percent (84.7%) of the caregivers of children with recurrent pneumonia, had a high level score of caring behaviors. The mean and standard deviation scores were 101.7 and 10.5, respectively; and
- 2. There was a statistically significant positive correlation between perceived severity and caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia (r = .518, p < .01). There was a statistically significant negative correlation between perceived barrier and caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia (r = -.312, p < .01).

This study provides an understanding of caring behaviors, perceived severity of pneumonia in children, and perceived barrier of caring behaviors among caregivers of children with recurrent pneumonia. This information can be used as a guide to improve caring behaviors and prevention among caregivers of children with recurrent pneumonia.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University All rights reserved