

บทคัดย่อ

ความสำเร็จในการทำพัลโฟโตมิในฟันกรามหลังแท้

การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามแท้ ทันตแพทย์จะพบว่าทำได้ยาก เนื่องจากจากคลองรากฟันมีขนาดเล็กและบางที่คลองรากฟันโค้งงอไม่สามารถขยายถึงปลายรากได้ ในฟันกรามหลังแท้ที่มีโพรงประสาททะลุจนไม่สามารถ Capping ได้ แต่โพรงประสาทยังมีสภาพที่ดีอยู่ จึงใช้วิธีการทำพัลโฟโตมิซึ่งประหยัดเวลาของทันตแพทย์ผู้ทำและผู้ป่วยด้วย การศึกษาครั้งนี้ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสารที่ใส่ลงไปในโพรงประสาท (Pulp dressing) พบว่าผู้ป่วย 23 คน ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีพัลโฟโตมิ ผู้ป่วยที่กลับมาด้วยอาการปวด 3 คน จากการติดตามผล 1 ปี

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University

All rights reserved

ABSTRACT

Pulpotomy in the Molar teeth

Root canal treatment of molar teeth is difficult to locate canal orifice and to enlarge the canals. When the exposure of the molar teeth are larger than pin point or pin head cavity which we can't do pulp capping, but the pulp are healthy, Pulpotomy is indicated.

In this research, Calcium hydroxide is used as pulp dressing in doing pulpotomy. The result is, three from twenty-three patients came back with pain and twenty patients had no symptoms after one year followed up.